

衛

生

寶

鑑

眼目諸病并方

上命周都運德甫諸路求醫治眼名方得

金靈膏於濟南劉太醫用之多效此藥除昏退翳截赤定痛治一切眼神効

滑州黃丹

麝仁

搗碎各一兩

黃連

半兩

蜜六兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝五七條把定攪之次下麝仁滾拾數沸又下黃連以柳枝不住手攪熬至二升箴簪內傾藥在紙上慢上滴之無令塵汚如有痰肉加礪砂末一錢上火煨開入煎膏子內用此藥多效故錄於此

加味春雪膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛腫澁難開多淚疼痛或

生翳膜

黃連

四兩洗淨用童便二升浸一宿去粗用汁拌研其石汁及留石為用

南礪甘石十二兩

好黃丹

六兩水飛

烏魚骨

燒存性

乳香

當歸各三錢

白丁香

半錢

麝香

輕粉

各少許

硃砂

一錢研細水調瓶內放湯

瓶中候乾為度

右十味各為末另裹起用白砂蜜二十兩煉去蠟下礪耳

石末不住手撓次下黃丹及諸藥末不住手撓至紫色不

粘手為度搓作梃子每用一粒新汲水少許化開時上點

洗之忌酒濕麵猪肉蕎麵

上清散治上熱鼻壅塞頭目不清利此二方予從軍征南數年有

病眼者用之多效

川芎

薄荷

荊芥穗

各半兩

盆硝

石膏

桔梗

各一兩

右為末每服一字口噙水鼻內搐之神效加龍腦三分尤妙

重明散治一切風熱之毒一衝眼目暴發赤腫疼痛或生翳膜赤肉癰潰羞明兩臉赤爛

礪甘石 一斤火燒用黃連水淬為末

煅乾為度

黃連

銅綠各半兩

川椒 二錢熬膏子入礪甘石末以火

雄黃 二錢

蒙豆粉 四兩

礪砂 三錢

蒲黃 兩

右六味同礪甘石末密羅上過乳細齒上嚼不糝為度後用腦子一錢南鵬砂一錢研細用大豆卷之每用少許以骨筋乾點卧少時忌酒溫麵諸雜魚肉辛熱等物此方得之路大夫家數口為生

夜光散治赤眼翳膜昏花

宣黃連

呵子各二兩

當歸一兩

銅綠一錢

右咬咀以河水三升同浸兩晝夜於銀石器熬取汁約一大觔內八分來得所看相黑色為度生絹紐取汁再上文
武火熬槐柳撓滴水成珠為度

從猪胰子

二箇先去脂以和秤葉摘裹於水內燒光令脂盡細切入黃連膏內煮黑色取出用之

礪其石

一兩童便一大碗炭火燒紅碎之令小便尽其石粉白為度研細末

黃丹

四兩新水淘淨飛細焙乾

鵝梨十箇竹刀切去皮心布取汁用

青鹽

六錢研細

蜜一斤煉去蠟相一沸止

右將梨汁并石膏子內熬五七沸入青鹽以楊柳枝撓至褐色傾入磁甕冷水水浸撓去火毒霜月合為妙正月十一月次之餘月各不可合每用銅筋蘸藥點入眼大皆肉

碧霞丹治目赤腫癰疽難開

銅綠

三朱

枯白礬

三朱

乳香

一朱

石為末將黃連熬成膏子入藥丸如雞頭大水浸開洗之
魚膽丸太醫太史齊正臣傳大效

黃連

秦皮

當歸

石以參味淨水洗去泥土剉碎用溫水二升瓷盆浸藥一
宿於淨室中用鐵鍋內熬到一半藥力盡在水中新綿
濾去粗換綿濾兩遍再熬至觥半如稀糊狀取出銀器中
炭火上熬成膏子入腦子桑葉豆粉和成劑用觥蓋之旋
凡豆大用淨几上搓成細條子竹刀切如米大點之

撥雲散治眼因於遠熱不退而作翳膜遮睛昏暗明癰疽難開

川芎

褚實

龍膽草

羌活

薄荷

石決明

蒼木

大黃

刺芥穗

甘草

木賊

蜜蒙花

連翹

川椒

草決明

桔梗

石膏

甘菊花

白芷

地骨皮

白蒺藜

各半刀

檳榔

石燕一對

各半刀

石淨為末每服叁錢茶清調下食後日叁服已忌雜魚猪馬

喬麵辛熱之物

還睛散治眼翳膜氏流淚出瘀肉攀睛

龍膽草

川弓

草決明

石決明

猪實

梨穗

野菊花

甘草

野蒜子

白茯苓

川椒炒去目

仙靈皮

白蒺藜

木賊

茵陳蒿

各半兩

石為末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚肉及酒

麵熟物

甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目活血

駐顏暖水臟

甘菊花 二兩

枸杞子 四兩

熟地黃 三兩

乾山藥 半兩

右為末蜜丸桐子大每服二十九至五十九空心食後各

一服溫水送下

五秀重明丸治翳膜遮睛癰澁昏花常服清利頭目

甘菊

開頭者伍百个

荊芥穗

五百穗

木賊

去節伍百至

楮實

五百个

川椒

五百粒炒去目

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼時以嚥下噙化

不得食後忌酒麵熟物

養肝散治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退下大人皆宜

服取效

夜明砂

青蛤粉

穀精草 各一兩

右為末每服一錢五十歲以上二錢純猪肝一匙大一片批開參藥在內攤勻麻批定米泔水半碗煮肝熟取出肝便湯碗內薰眼分肝作三次嚼喫却用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時不效日二服

龍腦飲子治疳眼流膿主疳翳溫熱為病神效不治寒溫為病者

青蛤粉

穀精草 各半兩

龍膽草

羌活 各三錢

麻黃 二錢半

黃芩 炒

升麻 各二錢

蛇退皮

川

鬱金

甘草 炙半兩

右為末每服二錢食後茶清調下忌辛熱物

助陽活血湯治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱
在難開因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼昏花而不
明宜助陽和血補氣

黃芪二斤

甘草炙

蔓荊子

各一錢

防風

七分

白

芷

升麻

當歸

柴胡

各伍分

右以咀作一服水一觔半煎至八分去粗熱服臨卧忌風
寒食冷物避風處睡

○灸雀目翳眼法

小兒雀目夜不見物灸手大指指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際
各一壯炷如小麥大

小兒翳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨

間陷中者是

○鼻中諸病并方

論曰膽遺熱於腦則嚏頻而鼻淵腦熱濁涕不止如湧泉不常而
下久不已成衄血之疾宜

防風湯主之

防風 去芦一兩半 人參 黃芩 麥門冬 去心

甘草 炙 川芎 各一兩

右為末每服二錢沸湯點服食後日三服

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐
血面黃大便黑此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此解
之

犀角 一兩研無以升麻代之 生地黃 半斤 牡丹皮 去心

芍藥 七兩半

右咬咀每服五錢水一觔半煎至一觔服有熱加黃芩二兩脉大來遲腹不滿自言滿為無熱不加黃芩也

生地黄湯治鼻衄昏迷不省以生地黄三五斤不暇取汁使患衄者生喫吸汁一二片許又以粗塞鼻須臾血止取汁服尤佳一婦人病經血半年不通因見塗中餘藥以為棄去甚可惜輒煎數杯其經即通乃知地黄之治血其功如此

地黄散治衄血往來久不愈

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

各等分

右四味焙乾為末每服二錢蜜湯調下日三服不拘時

三黃補血湯治六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火補氣以墜氣後以甘溫微苦酸補其血

生地黄

三升

熟地黄

二升

川芎

二升

當歸

柴胡各

半

升麻

黃芪

牡丹皮

各一錢

芍藥

半兩

此藥補之以防血溢止渴

右以咀每服五錢水二觔煎至一觔去粗稍熱服食前

凡兩寸脉兩頭則有中間全無曰孔以血在上焦或衄血或嘔血

以犀角地黄湯則愈

清肺飲子治衄血吐血久不愈服此藥以三稜鍼於氣衝穴出血

立愈

五味子

十箇

黃芪

一錢

當歸身

麥門冬

去心

生地黄

人參

各伍分

右為粗末都作一服水二觔煎至一觔去粗溫服不拘時

候

治鼻衄不止或素有熱而暴衄諸藥不効以白紙一張作八疊或十疊投冷水內浸溫紙置頂中以熱熨斗熨至一二重紙乾立愈

寸金散治鼻衄不止

甘草

生

土馬驢

牆上有者是各一分

黃藥子

半兩

右為末每服二錢新汲水調下未止再服立止

麥門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參

去芦

麥門冬

當歸身

各五分

五味子

五箇

黃芪

甘草

芍藥

各一錢

紫苑

一錢半

右咬咀分作二服水二觔煎至一觔去粗溫服食後

離澤通氣湯治鼻不聞香氣服之忌一切冷物及風寒處坐卧行

云

黃芪 四錢

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

蒼朮

各三錢

甘草

炙二錢

白芷

麻黃

不去節

川椒

各一錢

右咬咀每服五錢水二觔薑二片棗二枚葱白二寸煎至

一觔去粗稍熱食遠服之

輕黃散治鼻中瘰肉

輕粉 一錢

砒黃 半兩

杏仁

一枚湯浸去皮尖并双仁

麝香

少許

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁合蓋定每

有患者不問深淺夜卧用骨筋或竹筋點如粳米大維鼻

中瘰肉上隔一日夜卧點一次半月取效

鉉紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癢疹俗呼肺風以腫

而淺在皮膚也

泊上硫黃

白礬

灰各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液
之洗漱罷及臨卧再上煎服升麻湯下瀉青丸服之除其
本也

○耳中諸病方論

黃帝鍼經云精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經而藏精氣通乎
耳耳者宗脉之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳聞五音若勞
傷氣血無受風寒損於腎臟而精脫精脫則耳聾也然五臟六腑
十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則臟氣逆各之
曰厥氣搏於耳之脉故令聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑
手少陽之脉動其氣厥逆而耳聾者其證耳內燁燁也手太
陽厥而耳聾者其候頰而耳內氣滿也宜以

燒腎散治耳聾

附子

炮去皮一兩

川椒

一兩去目炒

磁石

一兩能碎七通研水飛

右為末用猪腎一枚去筋膜細切葱鹽白各一分入藥末一錢鹽花一字和令勻以十重溫紙裹於煑灰火內燒熟空心細嚼酒解薄粥下之十日效

犀角散治風毒熱壅心胸痰滯兩耳虛聾頭重目眩神效

犀角屑

甘菊花

前胡

去芦

枳殼

剉妙黃

菖蒲

澤瀉

羌活

木通

生乾地黃

各半兩

麥門冬

一兩去心或作二兩

甘草

一兩

右為末每服三錢水一盞煎至五分去粗食後溫服

扶神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胸膈痞滿昏悶不利

扶神一兩

羌活

蔓荊子

防風

菖蒲

薑

苡仁

黃芪各半斤

五味子半斤

麥門冬一斤半

甘草一斤

右為末每服三錢水一中觥生薑半片煎至五分去粗食

後溫服

○耳卒聾并治法

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血脉上入耳正氣與邪氣相搏故令耳卒聾也宜以

蒲黃膏治卒聾也

細辛

蒲黃各一分

麴末三分

杏仁

三分湯浸去皮尖及雙仁

右為末研杏仁如膏和勻捻如棗核大綿裹塞耳中一日

一易以瘥為度

龍腦膏治卒聾

龍腦

半分研

椒目

五分

杏仁

一分湯浸去皮尖双仁

右為末研杏仁膏和如棗核大綿裹塞耳中日二易之
○聾耳諸方

夫耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁謂之聾耳也
禹餘糧治聾耳有膿水塞耳

禹餘糧

燒醋淬七遍

烏魚骨

金底墨

伏龍肝各

分

附子

一箇去皮臍生用

右為末以綿裹如皂角子大安耳內日再易之如不瘡者
內有虫也

松花散治聾耳膿水不絕

白礬

半分研

麻勃

木香

松脂

花胭脂各一

右為末先用綿淨拭膿盡後以藥滿耳填取效

白連散治聾耳出膿汁

白礬

烏賊魚骨

黃連

龍骨各一兩

右為末以綿裹棗核大塞耳中日三易之

紅綿散治聾耳出膿以白礬拈成白灰每用二錢入胆脂二字研勻用綿杖子纏去耳中膿及黃水盡即用別綿杖引藥入耳中令到底膠之即乾如壯盛之人積熱上攻耳中出膿水不瘥用局方無憂散送雄黃丸瀉三五行瘥

○耳中生瘡諸方

夫耳内生瘡者為足少陰腎之經其氣通於耳其經虛則風熱乘之隨脈入於耳與氣血相搏故令耳内生瘡也

曹青散治耳內有惡瘡

雄黃

七分半

曾青

五分

黃芩

二分五

右為末每用少許內耳中如有膿汁用綿拭子拭乾用之

黃連散

黃連

半刀

白礬

七分半

右為末每用少許綿裹內耳中

黃芪丸治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹四肢抽掣

疼痛

黃芪

去芦一两

白蒺藜

炒

羌活

各半刀

黑附子

一个

羯羊腎

一對焙乾用

右為末酒麪糊丸如桐子大每服三四十九空心晚食後

葱鹽湯下

蔓蒲挺子治耳中痛

蔓蒲

附子炮去皮臍

右為末每用少許油調滴耳中立效

又方治耳廔倉鹽不以多少炒熟用棗麴蒸物青花布包定枕之其効如神

通耳丹治耳聾

安息香

桑白皮

阿魏各一兩半

硃砂半兩

右用巴豆七箇葶麻仁七箇大蒜七箇研爛入藥末和勻棗核大每用一九綿裹內耳中如覺微痛即出之

治蟣蚰入耳方濕生虫研如泥攤在紙上搥成紙撚安耳中即出又方蝸牛虫去殼研爛滴水五七點再研勻灌耳內無活者乾者研可

治蜈蚣入耳炙猪肉掩兩耳即出

又方用生薑汁灌耳中即出

治飛蛾入耳醬汁灌入耳即出

又方擊銅器耳邊即出

治蟻入耳以大蒜搗取汁灌耳中

又方鰕蛸甲燒灰水調濃清者滴耳中即出

又方豬脂一指大炙令香安耳孔邊即出

一切虫物入耳用口氣盡力吸出最妙

衛生寶鑑卷之十終

咽喉口齒方

龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉癰或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹蒲口生瘡飲食難嚥並皆服之

南鵬砂研 川芎各一兩 生地黄 犀角屑 羚羊

角 南琥珀研 南玄參 桔梗 升麻 鉛白

霜研 連翹各五錢 馬牙硝 赤茯苓去皮 人參

腦子研各三錢 硃砂飛 牛黃研各二錢 麝香三錢研

右十八味為末煉蜜丸每兩作十九金箔五十片為衣每服一丸用薄荷湯或新及水化下若細嚼并嚙化津液嚥下皆可食後臨卧服

祛毒牛黃丸治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口内生瘡涎潮而

急胸膈不利不欲飲食

人參

犀角

取末

南琥珀

研

桔梗

生地黄

洗水

南鵬沙

各半兩

牛黃

研三錢半

雄黃

一兩飛

南玄參

升麻

各三錢

蛤粉

四兩水飛

硃砂

研七錢

腦子

鉛白霜

各一錢

寒水石

燒去火毒二兩

右為末入研藥勻蜜丸如小彈子大金箔為衣磁器內收
每服一丸濃煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食後日

進三服噙化亦得

硃砂膏鎮心安神解熱又虛損嗽血等疾

食油

二錢半

硃砂

研

真珠末

生犀

人參

甘草

炙

玳瑁

各一兩

牛黃

麝香

龍腦

南

鵬砂

羚羊角

遠志

西琥珀

安息香酒煮

赤茯苓

去皮各半兩

蘇合油

和藥亦得

鐵粉

各一分

右為末煉蜜破蘇合油和劑為小錠子更以金箔為衣磁

合內密封每服一皂角子大食後噙化衛尉葉承得效并

阿膠丸相雜服此藥活血安神更勝如至寶丹每兩作伍

錠子

碧玉散治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉癰重舌

木舌腫脹可服

青黛

益硝

綿黃

甘草

各等分

右為末和勻每用少許乾糝於咽喉內細上噙津綿裹噙

化亦得若作丸用砂糖和丸每兩作五十九每服一九噙

化嚥津亦得

發聲散治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼藥過泄之此

妨悶明熱也

芡菱

一兩

白殭蚕

半兩炒

桔梗

新白者七錢半炒

甘草

二錢炒

右為末每用少許乾糝咽喉中若大腫痛左右有紅或只

一壁紅紫長大而水米不下用此藥一錢朴硝一錢調和

勻乾糝喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥

一錢加白礬半錢細研如粉和勻乾糝之

玄參散治懸癰腫痛不可食

玄參

一兩

升麻

射干

大黃

各半兩

甘草

半錢

右為末每服三錢水一觔半煎至八分放溫時以含嚥良

驗

喉痛如腫湯治風熱上攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並宜治之

桔梗二兩 甘草炙各一兩半 防風半兩 枳殼湯浸去

右為末每服三錢水一大觔煎至七分去粗入酥如棗許攪勻溫服食後

三奇湯感寒語聲不出

桔梗三兩蜜拌乾煎 甘草二兩半生 訶子四箇去核

右為末每服一錢加入砂糖一小塊水五觔煎至三觔時時細呷一日服盡其聲速出

玉粉丸治冬月寒痰結咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會

厭卒然如啞宜服玉粉丸

桂一字 桑烏一字 半夏洗五錢

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸雞頭大每服一九至夜
含化多年不愈者亦效

開閉散治癰喉風氣息不通

白殭蚕

直者炒去絲嘴

枯白礬

等分

右二味為末每服三錢生薑蜜水一觔調下細心服之不
拘時候

備急如聖散治時氣癰喉風漸入咽喉閉塞水穀不下牙關緊急
不省人事

雄黃

研生用

白礬

飛

藜蘆

厚者去皮用仁生用

猪

牙皂角

去皮弦各等分

右四味為末每用一豆大鼻內搐之立見效

解毒雄黃丸治喉風及急喉痺

舊金

雄黃 各一分

巴豆

去皮膜出油十四粒

右為末醋糊為丸菴豆大用熱茶清下七丸吐出頑涎立便蘇省未吐再服

○肺熱喉腥治驗

梁濟民因膏粱而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭唾涕稠粘口舌乾燥以

加減鴻白散主之難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也方

桑白皮

桔梗

各二錢

地骨皮

甘草

各一錢半

知母

七分

麥門冬

黃芩

各五分

五味子

二十箇

右咬咀作一服水二觔煎至一觔去粗溫服食後忌酒麪

辛熱之物日進二服

論曰梁氏膏粱之子因多飲大熱之物所傷滋溢心火形於肺金

故以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣用以為君黃芩知母苦寒治氣息腥臭清利肺氣用以為臣肺欲收急食酸以收之五味子之酸溫以收肺氣麥門冬甘苦寒治涕唾稠粘口舌乾燥用以為佐桔梗軀輕辛溫治痰逆利咽膈為使也

口糜論并治法方

逆調論云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀不轉下傳小腸以道赤散去小腸熱五苓散瀉膀胱熱故以通赤散調五苓散主之

胡黃連散治口糜麻孝卿傳

胡黃連

五錢

細辛

宣黃連

各三錢

藿香

一錢

右四味為末每用半錢乾糝口內漱千漱吐之

綠袍散治老幼口瘡多時不效者

桔槩 四兩

甘草 炙二兩

青黛 一兩

右先杵二味為末入青黛同研勻每用半錢乾搦口內

醋醬鹽一二日

黃連升麻散治口舌生瘡

升麻 一兩半

黃連 七錢半

右為末綿裹含嚥汁

多効散治唇緊疼及瘡

訶子肉

五倍子

各等分

右為末用少許乾粘唇上立効

紅芍藥散歌曰

心病口瘡

紫桔紅苓

三錢四兩

五服安康

右用紫苑桔梗紅芍藥苓朮等分為末羊肝四兩批開

藥三錢麻札定火內燒令香熟空心食之大效後用白湯

下

遺山牢牙散王漢卿所傳方云折太守得之於李節使折得此方九十餘歲牙齒都不曾疎豁及無疼痛漢卿今八十九歲食肉能齒決之知此方如神也

茯苓 石膏 龍骨 各一兩 寒水石 白芷 各半

細辛 三錢 石燕子 大者一枚小者用一對

右七味為末早晨用藥刷牙晚亦如之

玉池散治風蛀牙疼腫痛

當歸 藥本 地骨皮 防風 白芷 槐花

川芎 甘草 升麻 細辛 各等分

右為末每用少許指牙痛甚即取二錢水一盞半煎豆

一合生薑三片煎至一觔稍溫漱口候冷吐之

救苦散治一切牙疼及寒風蛀牙疼

川烏

草烏

桂花

良薑

紅豆

胡椒

萆撥

細辛

各半錢

石膏

官桂

各二錢

右為末先漱淨裏外乾摻之出涎立愈

萆撥散治風蝕牙疼兼治偏正頭疼

萆撥

二錢

蝎梢

良薑

各一錢

草烏

去皮尖五分

右為末每用半字先含水一口應痛處鼻內嚙上吐了水

用指粘藥擦牙疼處立定

麝香散治牙疼

府考卿傳

銅綠

五錢

白芨

二錢半

白欬

三錢半

白礬

二錢半

麝香

一錢

右為末用麝香研細入藥和勻每用少許貼於牙患處
乳香丸治走馬牙疳如神

明乳香

輕粉各半錢

砒半錢研

麝香少許

右先將乳香在鉢內令一人執鉢水盆內浸鉢底一人研
乳香如粉細取出入輕粉麝香砒再細研和勻每用以薄
紙一菲葉潤去藥內按過搗紙少許丸如黃豆大夜間先
漱口齒淨後以細杖子粘藥丸劄牙疳處至明便効忌食
醋鹽

衛生寶鑑卷之十一終

衛生寶鑑卷之十二

名方類集

○咳嗽門并論治法方

此論出東古家珍

論曰咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也若咳嗽有聲而有痰者因傷肺氣動於脾濕也故咳而兼嗽者也脾濕者秋傷於濕積於脾也故經云秋傷於濕冬生咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣而不為痰也若有痰而寒少熱多各隨五臟證而治之假令濕在肝經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之溫痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰各宜隨證而治之咳而無嗽者以辛甘潤其肺咳而嗽者治痰為先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈

人參欬花散治喘嗽久不已者予從軍過鄧州儒醫高仲宣傳此

并紫參散其効

人參

欵冬花各五錢

知母

貝母

半夏各三兩

御米殼

去頂炒二兩

右為粗末每服五六錢水一觥半烏梅一箇煎至一觥去

粗溫服臨卧忌多言語

紫參散治形寒飲冷傷肺喘促痰涎胸膈不利不得安臥

五味子

紫參

甘草炙

麻黃去節

桔梗各五錢

御米殼

去頂蜜炒黃色二兩

右六味為末每服四錢五分白湯點服嗽住止後服

九仙散治一切咳嗽太醫王子昭傳甚効此方得之於河中府姜

晉勾

人參

欵冬花

桑花

桔梗

五味子

阿膠

烏梅各一兩

貝母半兩

御米皮八兩去頂氣炒黃

右為末每服三錢白湯點服嗽住止後服

人參蛤蚧散治三二年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血蒲面生瘡

身黃腫

蛤蚧

一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥臊炙黃色

杏仁

去皮尖炒五兩

甘草

炙五兩

知母

桑白皮

人參

茯苓去皮

貝母

各二兩

右八味為末淨磁合子內盛每日用茶送服永除神效

人參清肺湯治肺臟不清欬嗽喘急及治肺痿勞嗽

人參

阿膠

地骨皮

杏仁

知母

桑白

皮

烏梅

甘草

嬰粟殼

右等分吹咀每服三錢水一觔半烏梅炙子各一箇同煎至

一錢去粗食後臨卧服

人參欵花膏治久新一切嗽疾

人參 欵冬花 五味子 紫苑 桑白皮各二兩

右五味為末蜜丸如雞頭大每服一九食後細嚼淡薑湯

下或含化亦得

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎不利寒熱往來

紫苑茸五錢 紫蘇五錢 半夏飽五錢 杏仁一兩炒黃

陳皮五錢 五味子五錢 桑白皮二兩半一方或用一兩

右為粗末入杏仁壹兩去皮尖炒勻每服三錢水一錢

半薑三片煎至一錢去粗溫服日二

欵花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安卧

人參 甘草炙 甜葶藶生 白礬研 欵冬花各一兩

御米殼

四兩醋炒

石為末每服二錢溫米飲調下食後忌油膩物及多言語損氣一方加烏梅一两去核

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃

去節炒黃

木香

當歸

各一两

人參

去芦二两

杏仁

二兩雙炒

御米殼

去頂炒二两

右六味為末每服四錢水一觔半煎至一觔去粗溫服食

後

緊圍參丸治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞痛短氣噎悶下焦不利脚

膝微腫

蛤蚧

一對酥炙

人參

二錢半

白牽牛

炒

木香

甜

葶藶

炒

苦葶藶

各半两

枳殼

五錢

右為末用棗肉為丸如桐子大每服四十九煎入參湯送下食後

團參散治肺氣咳嗽上喘不利

紫團參 欵冬花 紫苑茸 各等分

右為末每服二錢水一觥烏梅一箇煎至七分去粗溫服食後

安肺散治咳嗽無間新久

麻黃 不去節二兩 甘草 一兩炒 御米殼 四兩去頂炒黃

右為末每服三錢水一觥烏梅一箇煎至七分去粗溫服臨卧

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神效

半夏 湯泡七次焙 馬兜鈴 去皮 杏仁 各一兩去皮尖

巴豆 二十粒研去皮油

右除巴豆杏仁另研外餘為細末用皂角熬膏子為丸如
右為末薑汁糊為丸梧子大每服十九至二十九薑湯下
食後臨卧服

化痰玉壺丸治風痰吐逆咳嗽

生南星

生半夏

各一兩

天麻

半兩

頭白麵

三兩

右為細末滴水為丸梧子大每服三十九用水一大觥先
煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即漉出放溫別用薑湯下
不拘時

皂角化痰丸治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠粘噎
塞吐逆不思飲食或時昏憤

人參

去芦

赤茯苓

去皮

白礬

若

半夏

泡七次

白

附子泡

南星

泡各一兩

枳殼

炙二兩

皂角木白皮炙

半一兩

右為末生薑自然汁打糊丸如桐子大每服三十九溫水

送下食後

溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不已

半下

泡三兩

陳皮

去白

乾薑

白朮

各二兩

右為末生薑自然汁打糊為丸如桐子大每服二十九薑

湯送下不拘時候

延壽丹

天麻

半兩

白礬

一兩半生半枯

枸杞子

半夏

泡七次

乾薑

各一兩半

人參

一兩

右為末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去蒸餅搗

藥為丸如桐子大每服三十九溫水送下食後臨卧服

大阿膠丸治咳嗽并嗽血唾血經效

阿膠剉碎炒 卷柏去土 生地黄 大薊抽根者日乾

乾山藥 五味子 薄荷各一兩 栢子仁 人參

遠志 百部 麥門冬 茯苓去皮 防風各半兩

一方有熟地黄一兩

右十五味為末煉蜜為丸如彈子大不拘時候濃煎小麥

并麥門冬湯嚼下半丸加至一丸若氣虛空心不可服

此

恩袍散治咯血吐血唾血及治煩燥

生蒲黃 乾荷葉

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯放溫調下食後

地血散治一切吐血咳血能解一切毒及諸熱煩躁

黃根四兩 大豆三兩 黃藥子 甘草各二兩

右為末每服二錢新汲水調下加人參二兩治痰嗽有血

五味黃芪散治困嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

黃芪 麥門冬 熟地黃 桔梗各五錢 甘草二錢

半 白芍藥 五味子各二錢 人參三錢

右為粗末每服四錢水一錢半煎七分去粗溫服日三服

透羅丹治痰實咳嗽胸肺不利太醫王子禮傳此方得之於西夏

下痰甚快以透羅名者謂脫羅網之患也

皂角 酥炙去皮弦 黑牽牛炒 半夏 大黃濕紙包煨

杏仁 去皮尖麩炒各一兩 巴豆 一錢去油另研

右六味為末生薑自然汁九桐子大薑湯送下三十九咳

嗽甚者三四服必效

大利膈丸治風熱痰實咳嗽喘滿風氣上攻

牽牛

四兩生用

半夏

皂角

酥炙

青皮

各二兩

槐角

一兩炒

木香

半兩

右六味為末生薑打糊和九桐子大每服五十丸食後生

薑湯送下

全真丸金朝興定年間宣宗賜名保安丸治五臟積熱洗滌腸垢
潤燥利滯風毒攻注手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠
粘胸膈痞悶腹脇脹滿戒食嗜卧困倦無力凡所內傷並宜服
之

大黃

三兩米泔浸三日逐日換水焙乾為末

黑牽牛

八兩半

兩生用

四兩同

取頭末

四兩

右以皂角二兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔一兩切片同皂角一盞熬至半碗去粗再熬至二觔投藥末丸桐子大每服二三十丸至五十丸諸般飲下無時

槐角利膈丸治風勝痰實胸膈痞滿及喘滿咳嗽

牽牛 一兩半

皂角 一兩酥炙

槐角 炒

半夏 各五錢

右為末生薑汁打糊丸桐子大每服三五丸食後生薑湯送下

滌痰丸治三焦氣逆下痰飲消食利胸膈滿咳唾稠粘面赤身倦常服化痰寬膈

木香

枳殼

京三稜

陳皮

青皮

枳殼

半夏

大黃

各一兩

黑牽牛

二兩炒

右為末糊丸如桐子大每服四五十丸食後生薑湯下

木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰飲寬胸膈

木香 七水半

人參

白附子

薑屑

陳皮

草薢

白茯苓

各五錢

半夏 一兩

右為末糊丸如桐子大每服三十丸溫薑湯送下

太白丹治三焦氣滯破飲除痰止嗽開胃此方并木香半夏丸得

之於張文叔

半夏

南星 炮

寒水石 煨

乾薑

白附子 炮

白礬

括各等分

右為末糊丸如桐子大每服三十丸溫薑湯下

括梗湯除痰下氣

括梗

微炒

半夏

鹽水

陳皮

去白各十兩

枳實

炒黃伍

右以咀每服二錢水一觔生薑三片同煎至七分去粗溫

服不拘時

定喘餅子累經神驗孕婦不可服

芫花

醋浸一宿炒

桑白皮

炒

吳茱萸

炒

陳皮

夫白各一兩

寒食麵

三兩

馬兜鈴

一兩

白牽牛

三兩半生半炒取淨末二兩

右為末入牽牛末和勻滴水和如櫻桃大捏作餅子取熟灰半掩於鐺內同炒餅子熟每服一餅爛嚼臨卧馬兜鈴湯送下如心頭不快加一餅或二餅至明微利下神效

○盛則為喘治驗

己未歲初秋越三日奉召至六盤山至八月中霖雨不止

元帥夫人年踰五旬身體肥盛因飲酒吃饅乳過

度遂病腹脹喘滿聲聞舍外不得安卧大小便澁滯氣口脉大兩倍於人迎関脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱太盛

上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制
平氣散以下之

青皮

去白

雞心枳實各三錢

大黃七錢

陳皮去白五錢

白牽牛

二兩半生半炒取頭末半

右為末每服三錢煎生薑湯一觔調下無時一服減半再服喘愈上有胸膈不利煩熱口乾時上咳嗽以加減瀉白散治之

內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫躰輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣故以為臣枳實溫性沉重下痰降氣大黃苦寒瀉滯實故以為使也

加減瀉白散方

知母

陳皮

去白各五錢

桑白皮

一兩

桔梗

地

骨皮

各五錢

青皮

去白

甘草

炙

黃芩

各三錢

右吹咀每服五錢水二觔煎至一觔去粗溫服食後數服

良愈

華陀云盛則為喘減則為枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要曉會得本意且盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以火入于肺衰與不足而為喘為故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺用苦寒之劑者非瀉肺也瀉肺中之火實補肺氣也用者不可不知

○嘔吐吃逆

丁香安胃散治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

人參 丁香 各一錢 藿香 七分半 陳皮 二錢半

右為末每服二錢水二觔生薑三片煎至一觔去粗涼服
食前和粗服亦可

二陳湯治痰飲為患

半夏 橘紅 各五兩 茯苓 三兩 甘草 炙一兩半

右咬咀每服五錢水一觔半薑五片烏梅半箇同煎至八
分去粗熱服不拘時嘔吐甚者加丁香一兩

丁香柿蒂散治諸腫吃噫嘔吐痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮 各等分

右為粗末每服三錢水一觔半煎至七分去粗溫服無時

養活附子湯治吃逆

木香

附子炮

羌活

茴香

各半兩炒

乾薑

一兩

右五味為細末每服二錢水一觔半鹽一捻煎二十沸和粗熱服一服止

治一切吃逆不止男左女右乳下黑盡處一葉葉許灸三壯病甚

者灸二七壯

○消渴治法并方

生津甘露飲子治膈消大渴飲水無度舌上赤澁上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噦善怒健忘臀肉腰背痠寒兩足冷甚順德安撫張耘夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便數多先師以此藥治之旬日良愈古人云消渴多傳瘡瘍以成不救之疾既效亦不傳瘡瘍享年七十五歲終名之曰生

清甘露飲子方

人參

山梔子

甘草炙

知母酒洗

薑黃

升

麻各二錢

白芷

白朮

葎澄茄

甘草生各一錢

白葵

蘭香

當歸

麥門冬各半錢

黃蘗酒拌

石膏

各二錢半一方石膏用一兩一錢

連翹一錢

杏

仁一錢半

木香

黃連

柴胡各三分

桔梗三錢

全蝎一箇

藿香二分

右為末湯浸餗餅和成劑捻作餅子晒半乾拌篩如米大

食後每服二錢抄在掌內以舌舐之隨津嚥下或白湯少

許送亦可此治制之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下

消矣

論曰消之為病燥熱之氣勝也內經云熱淫所勝佐以甘

苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云滋水之源以鎮陽光故以黃連黃蘗梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸麥門冬杏仁全蝎連翹白芷白葵蘭香甘辛寒和血潤燥為佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白芷菖木香藿香薑澄茄為佐以輔之後用桔梗為舟楫使浮而不下也東垣先生嘗謂予曰索古老人有云能食而渴者白虎倍加人參大作湯劑多服之不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根大作湯劑廣服之

黃連丸治 消渴

用黃連半斤酒一升湯內重蒸伏時取出曬乾為末滴水為丸如梧子大每服五十丸溫水下

飲子治口乾燥生津液思飲食

麥門冬

去心

五味子

白芍藥

熟地黃

黃芪

各三兩

白茯苓

二錢半

天門冬

人參

甘草

各五錢

右為粗末每服三錢水一觔半生薑三片棗子二箇烏梅一箇煎至一觔去粗溫服食後

冬飲子治膈消胸滿煩心津液燥少短氣多為消渴

人參

茯苓

麥門冬

知母

五味子

生

地黃

甘草

炒

括萎根

葛根

各半分

右咬咀每服五錢水二觔竹葉十四片煎至七分去粗溫

服無時

麥門冬湯治消渴日夜飲水不止飲下小便即利此方并冬瓜飲

子得之張文叔

麥門冬

黃連

冬瓜乾

各二兩

右為粗末每服五錢水一觔煎至七分去粗溫服如無乾者用新冬瓜一枚重三斤去皮穰子分作十二片為十二服又方冬瓜一片擘破水三觔煎七分去粗溫服日三冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無度

冬瓜 一箇

黃連

十兩為末

右先取冬瓜割開去穰淨糝黃連在冬瓜內再將頂蓋熟灰火中燉熟去皮細切爛研用布取汁每服一觔至二觔食前日三服夜二服

○辨六經渴并治法

太陽渴脉浮無汗者五苓滑石之類
陽明渴脉長有汗者白虎涼膈之類

少陽渴脉弦而嘔者小柴胡加瓜蒌根也

大陰渴脉細不欲飲水縱飲唯思湯不思水四君子理中湯之類
少陰渴脉沉自利者猪苓湯三黃湯之類

厥陰渴脉微引飲者當少少與之

滑石治渴本為竅不利而用之以其燥而能亡津液也天令濕氣
太過當用之若無濕而用之是為犯禁假令小便不利或渴或
不渴知內有濕熱也小便自利而渴知內有燥也濕宜滲泄之
燥宜潤之則可矣

雜證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之

傷寒食少而渴者當以和胃藥止之不可用涼藥恐損胃氣愈不
能食白朮茯苓是也

太陽無汗而渴者不宜白虎汗後脉洪大而渴者方可與之矣

陽明有汗而渴者不宜五苓若小便不利汗少脉浮而渴者宜之
若人病心肺熱而不渴者知不在大陰少陰之本只在標也在標
則不渴矣若渴者是在本也

膽痺治驗內經曰有病口苦名曰膽痺乃肝主謀慮膽主決斷盛
汁三合為清淨之府肝取決於膽或不決為之恚怒則氣逆
膽汁上溢故口苦或熱盛使然也主之以

龍膽瀉肝湯

黃芩七分 柴胡一錢 甘草生 人參 天門冬 黃連

知母 龍膽草 山梔子 麥門冬各五分 五味子十箇

右十一味以咀作一服水二觥煎至一觥去粗溫服食後

忌辛熱物此方因焦秀才病口苦予制此方治之得效

名龍膽瀉肝湯 ○衛生寶鑑卷之十二終

衛生寶鑑卷之十三

名方類集

○瘡腫門

丙午歲予居彙城人多患丁瘡縣尹董公謂予曰公職重下瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之無不效官給藥錢君當捨手醫之遂諾其請董公榜示通衢有患丁瘡者來城中羅謙甫處取藥如此一年餘全活者甚衆保生挺子千金托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方至元戊寅歲董仲拜中書左丞兼樞密院事

保生挺子治丁瘡背疽瘰癧一切惡瘡

金脚信

雄黃

硃砂

各二錢

麝香

一錢

輕粉

半大厘半大釐

巴豆

四十九粒文武火炒研

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥和成挺子冷水浸少

時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子
次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹
神聖膏藥治一切惡瘡

當歸

藁本

各半兩

沒藥

二錢

黃丹

黃蠟

各二兩

乳香

二錢

琥珀

二錢半

白芨

二錢半

膽礬

粉霜

麝香

白膠香

三兩

清油

一斤

木鼈子

五十箇

去皮

巴豆

十五箇

槐枝

柳枝

各一百二十條

右件一處先將槐柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥

熬至黑焦亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用緋

帛攤之立有神效

千金托裏散治丁瘡發背一切惡腫

官桂

人參

甘草

川芎

香白芷

芍藥

各一兩

木香

沒藥

各三錢

乳香

二錢

當歸

半兩

連翹

一兩二錢

黃芪

一兩半

防風

桔梗

厚朴

各二錢

右十五味為細末每服三錢酒一大觥煎三二沸和粗溫

服無時

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃

生二兩半
半熟

芒硝

甘草

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任化

下童便半觥研化服亦得忌冷水

二仙散治十腫惡瘡太醫院李官勾傳

白礬

生用

黃丹

各等分一方加雄黃少許更捷

右各另研臨用時各炒少許和勻三稜鉞刺瘡見血待血

盡上藥膏藥蓋之不過三湯決愈

曲陽縣慈順里劉禪師善治瘡瘍癰瘰其効更捷壬子歲
到六盤山迴瓜忽都地面住冬朝夕相從傳得四方太一玉燭
散尅效散翠玉膏用之每有神效甲寅歲仲秋王師還遣使送禪
師迴鄉里賜院門額曰慈濟禪院

太一膏治瘰子瘡神效

腦子

一錢研

輕粉

乳香

各二錢研

麝香

三錢研

沒藥

四錢研

黃丹

五兩

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝撓又用熬兒葱七枝
先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手撓視冷
熟得所入腦子等藥撓勻磁器盛之用時旋攤

尅効散治瘰子瘡

官桂

硃砂

各半錢

赤小豆

四十九粒

粳米

四十九粒

斑猶四十九箇不去難足

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字
煎樟柳根湯送下空心服小便淋瀝為效如惡心嘔吐黃
水無妨瘰癧日日自消矣

玉燭散治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日取效

當歸

為藥

川芎

甘草

芒硝

熟地黃

大黃

黃芩

各半分

右為粗末每服三錢水一觔生薑三片煎至七分去粗溫
服

翠玉膏治癰瘡

瀝青

一兩

黃蠟

銅綠

各錢

沒藥

一錢

香油

石先研銅綠為末入油調勻又將黃蠟瀝青火內溶開次

下油調銅線攪勻將浸藥旋入攪勻用河水一掬將藥傾
在內用手扯按勻油紙裹視瘡大小分大小塊口嚼捻成
餅子貼於瘡上紙封三日一易之

黃連消毒湯治膏梁之變發背腦瘡始查者能消之

此方乃道山先生服之大效

黃連

黃芩

各一錢

黃蘗

藜蘆

當歸

桔

梗各五分

生地黃四分

知母四分

防已五分

羌

活

獨活

防風

連翹

各四分

人參

黃芪

澤瀉

甘草

蘇木

各三分

陳皮

二分

方咬咀都作一服用水三觔煎至一觔半去粗溫服食後

五利大黃湯治人年四十已前血氣壯實多苦患癰疽大小便不

通出外基

大黃煨三兩

升麻二兩

黃芩三兩

芒硝

梔子仁兩

右吹咀每服伍錢水一觥半煎至七分去粗稍熱服食
內消升麻湯治證同前

大黃 升麻 各二兩 黃芩 去黑心 枳實 炒去穢

當歸 各一兩半 甘草 炙一兩 芍藥 一兩半

右吹咀每服五錢水一觥半煎至七分去粗溫服食前

復元通氣散治諸氣澁閉耳聾耳痛腹癰便癰瘡疽無頭通一切氣

青皮 陳皮 各四兩 甘草 三兩半生半熟 川山甲 炮

括婁根 各二兩 加金銀花 一兩

右為末每服二錢熱酒調下如瘡無頭津液調塗此方活

血止痛內消瘡腫

乳香消毒散專治惡瘡

錦紋大黃

煨

黃芪

蜜煎者

牛蒡子

炒

牡蠣

鹽泥裹燒

金銀花

各五兩

甘草

三兩炙

沒藥

乳香

各半兩

懸葵

半兩

右九味為粗末每服五錢水一觔半煎至七分去粗溫服

瘡在上食後在下食前

內消丸治瘡腫初生及癰疽結核熱毒鬱滯服之內消

廣茂

炮

三稜

炮各三錢

青皮

去白

陳皮

各一兩去々

牽牛

半斤取頭末

薄荷葉

皂角

不蛀者水者軟條取汁去粗熬成膏各半斤

一方加沉香半兩

右為末入牽牛頭末和勻用膏和丸如棗豆大每服三十

丸煎連翹湯送下食後

竹葉黃芪湯治發背發渴通治諸瘡大渴

淡竹葉二兩 生地黃八兩 黃芪 麥門冬去心 當歸

川芎 人參 甘草 黃芩 芍藥 石膏各三

右十一味為粗末每服伍錢水一觥半竹葉五七片煎至

一觥去粗溫服不拘時候

五香連翹湯治瘰癧癰疽惡腫

沉香 乳香 生甘草 木香各一分 連翹

射干 升麻 獨活 桑寄生 木通各三分

丁香半兩 大黃二兩 麝香一水半

右以咀每服四錢水二觥煎至一觥去粗空心熱服

五香湯治毒氣入腹托裏

丁香 木香 沉香 乳香各一兩 麝香三水

咀者去麝加藿香一兩渴者加入參一兩

石為粗末每服三錢水一觔半煎至八分去粗空心稍熱服總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載與此方大同小異大抵此藥治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏冒口燥咽乾大便硬小便澀者皆莫與服之

赤芍藥散治一切惡丁瘡癰疽腫初發不消憎寒疼痛

金銀花 半兩

大黃 七錢半

赤芍藥 半兩

當歸

枳實

甘草 各三錢

右件入苴囊大者一箇同為粗末作四服每服水酒各一觔煎至一觔去粗溫服不拘時

金銀花散治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花

四兩去土

甘草

一兩炒

右為粗末每服四錢水酒各一觔煎至一觔去粗稍熱服

右二方申顯卿傳

乳香丸治諸般惡瘡癰

乳香

另研

川山甲

當歸

各五錢

猪牙皂角

木

鼈子

各七錢

右用松枝火燒存性為細末入乳香勻煉蜜丸如彈子大
每服一丸溫酒化下食前

水澄膏治熱毒腫痛大效

大黃

黃蘗

蔚金

白芨

天南星

朴硝

各

兩

右入黃蜀葵花乾者一兩共前藥為細末每藥末二錢以
新水一觥半攪勻澄沉底者去淨水以紙花子攤於腫上
貼之如乾燥津唾潤之如皮膚白色者勿用

瘰癧最治熱毒赤腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

生用各四兩

黃蘗

甘草

各二兩

右為末每用新水調搗於赤腫處或紙花子塗貼之如乾則水潤之

龍麝追毒丹治一切惡瘡內毒氣未出盡者皆可用之如箭頭針刺癰瘡惡瘡內有毒氣不着骨者不過一二上藥其針刺自出破傷風惡不痛者亦效

龍腦

三末

麝香

一分

輕粉

粉霜

雄黃

各五分

乳香

砒黃

各一字

巴豆

十四個去皮心膜

右研極細麵糊丸如麥粒大每用之先以針撚瘡口入藥量輕重上藥後一兩時辰腫痛盡是應如患下疳瘡鱗莖或半或盡者用漿磨一兩粒搽之不二上立效

桃紅散欬瘡口生肌肉定血辟風邪

寒水石燒 滑石各四兩 乳香 小豆粉 輕粉各一錢

右為末每用少許乾摻血不止者加灯草貼瘡口上以帛裹之

木香散治多時不斂一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香 南黃連 桉柳各半兩 白芷 三錢

右為末每日一遍乾貼

又方

地骨皮

右為末先口噙溫漿水洗瘡口上搽乾貼藥及治下疳瘡

神效

玉龍膏摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

黃蠟大者一箇去枝 黃蠟一兩半 白芷半兩 麻油

消真者

麝香 可一錢

松脂 研一錢

零香 藿香 各一

杏仁 去尖

升麻

黃芪

赤芍藥

白朮

白

欽

甘草

各一分

右以油浸七日却取出油先煉令香熟放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去渣入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以瓷合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癰瘡瘰癧瘡疼痛並塗磨令熱頻用之如耳鼻中肉鈴用紙燃子每日點之至一月即愈如治灸瘡及小兒癰瘡塗之兼滅殺痕神效

司馬溫公解毒膏治諸瘡及杖瘡尤宜貼之

乳香

三錢

木鼈子

二十四箇去皮

杏仁

四十八箇

草麻子

三十四箇

巴豆

十四箇

槐枝

四兩長四指

柳枝二兩

桃枝三兩

黃丹

春秋三兩半夏四兩冬三兩

右件用清油一斤下諸藥熬黑滴水內不散成也用好綿
纏過用時於水內浴貼之

善應膏

黃丹二斤細上等者

沒藥

三兩研

白欬

二兩生

官

桂一兩三分

乳香研

木鼈子生

白芨生

當歸

白芷

杏仁

生各一兩

柳枝

二兩如筋條長

右除黃丹乳香沒藥外餘藥用麻油五斤浸一宿移炭火
上鉄鍋內熬至變黑色濾去藥不用將黃丹入油內上火
用柳條如小錢粗四指長攪令微變褐色出火再用柳枝
攪令出烟盡入乳香沒藥再用柳條攪令勻候冷傾入磁
盆內用刀子盆內切成塊油紙裹之後用如常法

大紅膏治從高墜下及落馬墮車筋骨疼痛

當歸

赤芍藥

烏藥 各一兩

小油 半斤 浸上藥

沒藥

一兩 研

乳香

二兩 研

琥珀

二兩 研

黃丹

十兩

瀝青

一斤

右將瀝青於銀石器內熔開入油視公熱硬軟滴水不散用綿灑在銀石器內入黃丹并諸藥末用手不住攪令勻為度用時攤紙上貼傷處大有神效

消毒膏治一切腫毒結硬痲瘋

柴胡

去苗一錢

薑本

牛膝

續斷

丹參

牡丹皮

甘草

細辛

槐白皮

蒼朮

各一兩 半

羌活

何首烏

天麻

白芷

各二錢

玄參

葛根

升麻

白欬

木通

不香

當歸

洗焙

川芎

白附子

各二錢 半

亂髮 水浸

赤茯苓

各二兩半

木鼈子

去皮三兩

沉香

桃仁

湯浸

杏仁

湯浸去皮尖各三兩半

白芨

四錢

防風

五兩

赤芍藥

五兩

黃芪

五兩

黃丹

焙三錢

臘月澄清麻油一斤四兩

石竹葉三十三味入油內浸七日七夜於淨銀石器內慢

火熬候白正焦黃色放溫以白綿濾去粗於磁罐內密封

三晝夜候取出傾於鍋內慢火溫再濾去粗傾入好沙鍋

中慢火再熬次下黃蠟十五兩用竹篦不住手攪令勻次

下黃丹攪勻以慢火再熬候出火攪勻續次再上火三日

方欲膏成於磁合子內密封每用時以軟白絹上攤勻貼

患處

綠白散治湯火燒疼痛

苦參

不以多少

右細末用香油調搽

水霜散治火燒燎損湯油熱燒傷皮爛肉大痛

寒水石

生牡蠣

燒明朴硝

青黛

各一兩

輕粉一分

右為末新水調或油調濕則乾貼痛處立止如神

如神散治凍瘡皮膚破爛痛不可忍

川大黃

右為末新水調搽凍破瘡上

黃連散數多年不効瘡

木香

檳榔

黃連

各等

右為末先洗瘡淨乾貼水出勿恠未效隔三日再用貼之

○瘡總論

大凡瘡疾有五善七惡之證不可不察也燥煩時嗽腹瀉渴甚或

泄利無度或小便如淋一惡也膿血大泄腫厥尤甚膿血敗臭痛不可近二惡也喘粗短氣恍惚嗜卧三惡也目視不正黑睛緊小
白睛反青瞳子上看四惡也有項不便四肢沉重五惡也不能下
食服藥則嘔食不知味六惡也青嘶色敗口鼻青赤面目四肢浮
腫七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫
消色鮮不臭三善也神彩精明語言清爽四善也脉氣和平五善
也若五善見三則瘥七惡見四則危然則病有源同七惡皮緊急
者如善病有源同五善皮緩虛者如惡夫如是者豈凡醫之所知
哉若五善病至則妙無以加也如七惡並臻則惡之劇矣

汗之則瘥已

丁巳歲予從軍廼往冬於曹州界以事至州有趙同知謂予曰余
身半經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關

緊急喘唾稠粘飲食難下不得安卧一搗鹽於腫上砭刺四五百
餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然願請君一見予遂往診視
其脉浮緊按之洪緩此證乃寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而
赤腫經云天寒則地凍水冰入氣在身中皮膚緻密腠理閉汗不
出血氣強肉堅滿當是之時善行水者不能往水善寒地者不能
鑿凍善用鍼者亦不得取四厥必待天溫水釋凍解而後水可行
地可穿入脉亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以
苦溫之劑溫經散寒則已所謂寒絀腠理以苦發之以辛散之宜
以托裏溫經湯麻黃苦溫發之者也故以為君防風辛溫散之者
也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以為臣
血留而不行者則痛以香白芷辛溫當歸身辛溫以和血散滯溫
熱則腫蒼朮辛甘溫牀輕浮力雄壯能泄膚腠閉溫熱人參甘平

甘溫白芷味酸微寒調中益氣使托其裏故以為佐依方餌之以
薄衣覆其首以厚被覆其身卧於暖處使經血溫腠理開寒乃散
陽氣行大汗出後腫減八九分再服去麻黃防風加連翹黍粘子
腫痛悉去經言汗之則瘡已信哉斯言或人以仲景言瘡家雖身
腫痛不可發汗其理何也予曰此說乃營氣不行逆於肉裏而作
瘡腫作身疼痛非外感寒邪而作疼痛故戒之以不可發汗若汗
之則成痼也又問仲景言鼻衄者不可發汗復言脉浮緊必當以
麻黃湯發之衄血自止所說不同其故何也願聞其說予曰此議
論血正與瘡家緊同且夫人身血之與汗異名而同類奪汗者無
血奪血者無汗今衄血妄行為熱所逼更發其汗反助邪熱重竭
津液必變凶證故不可汗若脉浮則為在表脉緊則為寒寒邪靜
遏陽不得伸熱伏榮中迫血妄行上出於鼻則當麻黃湯散其寒

邪使陽氣得舒其血自止又何疑焉或者嘆曰知其要者一言而終不知其要流散無窮索古之學可謂知其要者矣

托裏溫經湯治寒積毛皮轉過經絡不得伸越熱伏榮中聚而為亦腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢軀疼痛

人參

蒼朮

各一錢

白芍藥

甘草

炙各一錢半

白芷

當歸身

麻黃

去節根各二錢

防風

葛

根各三錢

新升麻

四錢

右咬咀每服一兩重水三觔先煎麻黃令沸去黃用下餘

藥同煎至一觔去粗宜溫服訖卧於溫處以綿衣覆之得

汗而散

○凡治病必察其下

戊午冬予從軍仕久於成武縣有賈倉使父年踰六旬冬至後數

日疽發於背五七日腫勢約七寸許不任其痛湯醫曰視之膿已成可開發矣公俱不從三日醫曰不開恐變證生矣遂以燭針開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變證果生覺重如負石熱如炳火痛楚倍常六脉沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴凝復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時以從其證可也與湯醫議作清涼飲予加黃運絆一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除後月餘平復又陳錄判母年七十有餘亦冬至後腦出疽形有甌面大命湯醫診視俟蒼熟以鍼出膿因怒答侍妾詹輒內陷門一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脉極沉細而遲蓋緣衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已漸肥膿之氣獨存瘦瘠之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也

病與時同與瘍醫議連製五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡
瘍復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之
宜也諸痛瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪甚痛極如熱
終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用
也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣

○拾時從證

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂膊腫盛上
至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微此乃脉証俱寒予奉
瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燭鍼啓之膿清稀
解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂散兩服稍緩
次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳
下黑盡處灸二十七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香面

香羌活等藥以咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火
又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然
內經曰脉細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛况吃逆者胃中
虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相攻
須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之
諸證悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正彥和復用五香湯數服後月
餘平復噫守常者衆人之見知變者知者之事知常而不知變遇
事因而取敗者亦多矣况鑿乎哉守常之變豈可同日而語乎哉
托裏溫中湯治瘡為寒變而內陷者膿出清鮮皮膚涼心下痞滿
腸鳴切痛大便微澀食則嘔逆氣短促吃逆不絕不得安卧時
發昏憤

沉香

丁香

益智仁

茴香

陳皮各一錢

木香 一錢半

甘草 炙二錢

羌活

乾薑 炮三錢

黑附子

炮去皮膚四錢

右以咀作一服水三觔生薑五片煎至一觔去粗溫服無時忌一切冷物

內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故以附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表故以為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐蒼朮內攻氣聚而為瀉木香茴香陳皮苦辛溫治痞散積為使也

○打撲損傷從高墜下

繆刺論云人有所墜惡血留內腹中痛脹不得前後先飲利漿此

上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血刺足附上動脉不已刺三毛上各一穴

常歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫暗青疼痛或胸畜血內壅欲死

川大黃 一兩

常歸 三錢

麝香 少許另研

右為末入麝香研勻每服三錢執酒一觥調下食前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之復元活血湯治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍

大黃

一兩酒浸

柴胡 五錢

瓜蒌根

川山甲 炮

當歸 各三錢

紅花

甘草

各二錢

桃仁

湯炮去皮尖

七除桃仁為咬咀每服一兩用米二錢半酒半觥同煎至

七分下桃仁泥再煎一兩沸去粗大溫服食前以利為度

利後痛不尽者當服乳香應痛散

黃帝鍼經云有所墜隨惡血留內若有所大怒氣上而不
下行於脇下則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少
陽以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草
緩其急亦能生新血耳生血陽生陰長故也為臣川山甲
蒼朮根桃仁紅花破血潤血為佐大黃酒製以空腸敗血
為使氣味相合使氣血各有所歸痛自去矣

聖靈丹治一切打撲傷損及傷折疼痛不可忍

乳香 五錢

烏梅 去核五枚

高麗子

一大錢 熟黃色二兩

白米 一匙

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒送下喫一
服不痛勿服如痛再服

神效接骨丹治打撲傷損傷筋折骨交寒濕脚氣腿疼或一切惡瘡疼痛不止皆可服之

乳香

沒藥

白膠香

蜜陀僧各另研

紅豆

香白芷

大豆

貫弓

赤芍藥

自然銅火煨醋

為炭

當歸

洗三次焙

瓜子仁

水蛭

各四兩

右先以自然銅火燒紅醋淬燒如銀為度用四兩入前十

二味藥各等分同為末以黃蠟為丸如彈子大每服一丸

以黃米酒一觔煎開和粗溫服年少者只一服年老者加

添服病在上食後在下食前此藥內去自然銅水蛭瓜子

加桂花川練子茴香為細末酒麵丸如桐子大每服一五

九酸石榴湯送下食前日進二服治小腸氣如神一切腎

腰疼痛並皆治之此藥男子婦人老幼皆可服神效不可

具悉

乳香散治被瘡大有神效

乳香

沒藥 各三錢

茴香 四錢

當歸 五錢

自然銅

火燒醋淬七次五錢

右細末每服五錢溫酒調下立效

五黃散治杖瘡定痛

黃丹

黃連

黃芩

黃蘗

大黃

乳香 各等分

右為細末新汲水調成膏用緋絹綿紙攤在上貼於瘡上

紫金丹治打撲損傷及傷折疼痛不可忍

川烏

草烏 炮各一兩

五靈脂

木鼈子

去殼

黑牽牛 生

骨碎補

威靈花

金毛狗脊

自然

銅 醋淬七次

防風 各五錢

禹餘糧

醋淬七次

地龍

烏藥 青皮 去白 茴香 炒各五錢 乳香 沒藥

紅娘子 麝香 各二錢半 陳皮 去白一錢

右為末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九溫酒送下
病在上食後在下食前

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

獨科栗芋 雄黑豆 桑白皮 乳香 沒藥 各一

破故紙 炒二兩

右為末每服五錢醋一觔半沙石器內煎至六分入射香

少許溫服

花蕊石散治一切金傷撲損急以此藥搽傷處如內損血入腸胃

煎麝香入酒調下二錢服之立效

石硫黃 四兩 花蕊石 一兩

右二味為粗末拌勻先以紙筋和膠泥固濟瓦罐子一箇
內可容藥候乾泥入藥在內泥封口了焙籠內焙乾令透
熱便安在四方埽上用炭一秤籠疊周匝自巳午時從下
生火令漸上徹有墜下火旋夾火上直至經宿火冷炭消
盡又放經宿罐冷定取出細研窰合內盛依前法使用
湯鐵膏取箭頭一切鍼刺入肉尺皆治之

鼯鼠頭一箇 蟻蛄四十九箇 土消虫十箇 芫青

馬肉中蛆焙 醬內蛆焙 蟻娘 巴豆 信砒

礪砂 夏枯草 磁石 黃丹 蘇木 地骨

皮各一兩 石腦油三兩 蒿柴灰汁三升

右將灰汁石腦油以文武火熬成膏次下諸藥令勻磁器
內收貯臨用時看瘡大小點藥良久箭頭自然湧出

軍會用

葭莖科 今天仙子苗是也

右於端午前一日持不語彛上項科取酌中一科要根枝葉實全道先生你在這裏那道罷用柴灰自東南為頭闢了用木篋搬取子根下次日端午日未出依前不語用了鏹只一下取出用淨水洗了不令雞大婦人見於淨室中石臼中搗如泥丸如彈子大黃丹為衣紙袋內封了懸高處陰乾如有著箭其箭頭不能出者以緋絹袋盛一九放在脐下用綿裹肚繫了先用象牙末於箭瘡上貼了後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之

神聖膏取針因侵入皮膚

車脂不以多少

右成膏子者好攤紙上如錢大貼之一日一換三五次針自出大有神效

烏翎散取針鐵不侵入皮膚

烏翎三五枚火炙焦

右為末好醋調成膏塗瘡上紙蓋一兩次其針自出神效
黃石膏治金瘡深者若以藥速合則潰宜用

黃丹 滑石 等分

右研細敷之

又方

降真香一味更好

王合昇刀箭藥方

石灰 四兩

五月五日准備下烏魚骨 一兩

右五月五日平旦本人不語採地上青刺蒿葉各一握
同煎煮鵝於日未出時搗作餅子曬乾用時旋刮削敷之
早用並不作膿

○疣瘰癧疥癬皴揭附

癸丑歲承應冬佳於瓜忽都有太醫大使顏珉卿傳四方用之常
效故錄之

井金散治瘰癧大有神效

土黃 三錢

礞砂

雄黃 各二錢另研

粉霜

輕粉 各一錢

乳香

沒藥 各半錢

石為末假令瘰癧如胡桃大用藥末少許半錢用唾調如稀
麵糊得所攤於瘰癧頂上如小錢大唾濕紙花兩重蓋之後

用黃龍膏蓋之間日一度上藥次添藥胤的周圍大如龜
葉如此上之無度漸上拆之後根痒自然有裂疊隨後自
然下來

黃龍膏方

黃蘗 不以多少

右為末唾調攤在紙上

生肌青龍膏

呵子皮

龍骨

牙茶

等分

右為末乾摻上

做土黃法

砒黃

研二兩

木鱉子

去殼

巴豆

不去油各半兩

硃砂

研二錢

石件研黃一處為末後用木鑿子同石腦油和成一塊油
紙裹埋於坑內四十九日取出收於磁器內盛罈作小塊
灸瘡子法治果報面生疣瘡

右用艾丸灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如螺蛳磨大
貼灸處用膏藥重貼二日一易候痒折出膿如豆粉愈

貼癰方

草烏 半斤 川烏 四兩 乾桑耳 朽木 各三兩 細白

石灰 三碗 桑柴灰 上碗

右朽木等四味燒令存性同二灰研勻用水一桶淋汁如
法熬成膏用之

寶金散偏醫癰氣無不瘥神効妙方

猪羊膽 十對 煨水洗淨去脂 海藻 海帶 各二兩

琥珀

麝香

木香

丁香

真珠

半兩研

石件為末入研藥合勻再研極細重羅每服一錢熱酒一

角調下夜卧服垂頭卧若是在室男女不十服必效如男

子婦人患一月見效婦人有胎不可服

海帶九治癭氣久不消

海帶

貝母

青皮

陳皮

右件各等分為末煉蜜丸如彈子大食後嚥化一丸大效

海藻漬堅丸治癭氣大盛久不消散

海藻

海帶

昆布

各一兩

廣茂

青鹽

各半兩

右為末煉蜜丸如指大每服一丸嚥化食後

何首烏散治脾肺風毒攻衝遍身疥癬痒痛或生癰疹搔之成瘡

背背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻面頭生瘡及治紫白

癩頑麻等風

荊芥穗

蔓荊子

威靈仙

何首烏

甘草

防風

各一兩

右用蚶蜆草乾一兩同為末每服一錢食後溫酒調下沸湯亦得

蘭茹散治疥經年不瘥

水銀

一兩 好茶

二兩 蘭茹

三兩 輕粉

右為細末每用不以多少油調搽之

苦參散治遍身瘡疥癢經年不瘥

蔓荊子

何首烏

荊芥穗

威靈仙

苦參

各半

右為末每服二錢食前茶酒調下日三服忌發風物其妙

硫黃散治疥

硫黃

川椒

石膏

白礬

各等分

右為末以生油調搽神驗

狗脊膏治疥

硫黃

雄黃

信

川烏

黑狗脊

白

礬

巴豆

右為末先以油熬次下黃蠟調勻搽之效

栢脂膏治乾濕癬

栢油

黃蠟

杏仁

四十五个剉

朴硝一抄

右於鉄器內熬老生葱二根熬煎五七沸瀝過成膏

瘡

元顏和卿傳

祛濕散治乾濕癬

蚕砂

薄荷

右為末生油調搽之濕者乾搽之

苦參丸治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參

右為末粟米飯丸如桐子大每服五十九空心米飲湯送下

土粉散治熱汗浸漬成瘡腫痒炊痛

粟米粉二兩

寒水石服

定粉各一兩

白石脂

白

石膏

石膏各半兩

滑石八兩

蛤粉九兩半

右為末再研極細每用藥乾搽汗處

淋洗藥七宝散治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芩

當歸

防風

木通

荆芥穗

地骨

皮各三兩

右為粗末入白礬生末一兩每用一兩水三碗煎五六沸去粗熱洗拭乾避風少時

先師東垣老人路次方城北獨樹店客舍有摧江軸者皮膚皴裂不任其痛兩手不能執轆足不能履地停轍止宿因制此方之即效明日遂行

潤肌膏治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能迎風入手屢用屢效故錄於此

珠手青

四兩

白黃蠟

八兩

乳香

二兩

右於鐵鍋內先下瀝青隨手下黃蠟乳香次入麻油一二匙俟瀝青熔開微火熬動放大淨水盆於其旁以攪藥用鐵鉗滴一二點於水中試之如硬入香油看硬軟合宜新綿灑於水中揉扯以白為度磁器內盛或油紙裹每用先

火土炎裂口手熱捻合藥亦火上灸軟塗裂口上用紙貼
許貼之自然合矣

煩躁門

發汗吐下后虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹
湯主之若汗若下之后而煩熱者胸中窒者亦以枳實
云病人舊微溇者不可與之

枳實湯

肥枳實

四個碎

枳實

半合

右水二觔先煎枳實至一觔下枳實同煎七分服得吐止后

服

一云快利止后服

殊少安神丸治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胸中氣亂而有熱
若懊憹之狀皆屬上胃中伏火蒸上而不安宜從推衡法以鎮

陰火之浮行以養上焦之元氣

硃砂 一分另研水飛陰乾

黃連 去須半一分二分

生地

黃 三分

當歸 去芦

炙甘草 各半錢

右為末酒浸餅丸如黍米大硃砂為衣每服十五丸津唾送下食后此緩治之理也

內經曰熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除溫熱而為君甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血以為臣當歸補血不足硃砂能浮留之火而安神明也

八物定志丸平補心氣安神鎮驚除胸熱痰火

遠志 去心

菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓 去

兩

白朮 半兩

人參 五錢

牛黃 二錢另研

右為末入牛黃勻煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服二三
十九熟水送下無時

胸膈痞門

人參利膈元治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃滯滯調大便秘結推
陳致新消飲進食

麝香 一才半 當歸 三才 木香 枳殼 各二才半

人參 三才 甘草 炙五才 厚朴 薑製二才 枳實 五才

大黃 酒浸焙一才

右為末滴水丸如桐子大每服三十九食後溫湯送下此
治膈氣之聖藥也一方湯浸餅丸亦可

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸膈欲絕

枳殼 去穢殼炒 桔梗 各等分

右咬咀每服一兩水二觔煎至一觔去粗溫服食後

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胸膈宿有水氣頭眩心悸

人參去芦

赤茯苓去皮

陳皮去白各一兩

白朮

川芎

半夏

湯泡七次各半兩

右為粗末每服四錢水一觔半生薑五片煎至一觔去粗

溫服不拘時

通氣湯主胸膈氣逆

桂去皮三升

生薑六升

吳茱萸炒四升

半夏湯泡八升

大棗四箇

右咬咀用水一升煎取四合分作三服放溫服之對病增

損

膈氣噎門

能香散治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮吐暮食朝吐甚者食已輒
出其效如神

水銀

黑錫各三斤

硫黃五斤

右三味銚內用柳木槌研熟微火上細研為灰取出後入
丁香末二錢桂末二錢生薑末二錢二處研勻每服三錢
黃米粥飲調下一服取效病甚者再服

丁香附子散治膈氣吐食

丁香半兩

枳殼一箇重三斤

黑附一箇重半斤

舶上

硫黃

胡椒各二斤

右先將四味為末入研藥和勻每服二錢用飛硫黃一箇
去毛超足腸肚填藥在內濕紙五七重裹定慢火燒熟取
出嚼食後用溫酒送下日三服如不食葷酒粟米飲下不

計時

漢防已散治五噎

官桂 去皮

陳皮 各一兩去白

漢防已 五升

杏仁 浸湯去皮

共一升

紫蘇

羚羊角 銹

細辛 各七升平

右七味粗末每三錢水一觔半薑三片煎七分去粗溫服

忌酸味生冷滑物一日兩服

紅豆丸治諸嘔逆膈氣反胃吐食

胡椒

縮砂

揀丁香

紅豆 各二十一粒

右為末薑汁丸如皂角子大每服一九棗一箇去核填藥

麩果煨熟細嚼白湯下 每日三服

○心下痞門

大黃黃連瀉心湯治心下痞按之濡其脉關上浮者又傷寒天下

後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先用桂枝湯解表上解乃可用此湯攻痞

大黃二兩 黃連 黃芩 各一兩

伊尹湯液論云大黃黃連黃芩湯三味今監本無黃芩脫落之也

右以咀以煎沸湯二大觥熱浸之一時久絞去粗取熱作二服

大消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

半夏湯泡七次四錢 乾生薑 麴炒黃 砂仁 共

草炙各一錢 猪苓 一錢半 人參 橘皮 各二錢 厚

朴製三斤 枳實熬炒五斤 黃連去須 黃芩去焦各六

日木 薑黃 各一兩 一方加澤瀉三錢

右為末水浸餅丸如桐子大每服五七十九至百九白湯送下食後

枳實理中丸治中脘痞滿氣不宣通積久停飲食入不化

人參去芦 乾薑炮 枳實剉炒 甘草炙 白朮各等分

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼白湯送下湯化亦得不拘時

三腕疝氣丸治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛宜服

沉香 大腹子 檳榔 縮砂各半兩 青皮去白

陳皮去白 木香 白芷鹽 三稜炮各一兩 半

夏湯酒七次一兩

右為末糊丸如桐子大每服三十丸溫水送下陳皮湯亦

得食後

枳實消痞丸治右關脉浮緊心下虛痞惡食懶倦開胃進食

乾薑

錢

人參

白茯苓

甘草炙

白朮

麥蘖麴

各二錢

半夏麴

三錢

厚朴

製四錢

枳實炙

炒

黃連

各五錢

右為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十九丸溫水送下無時量虛實加減

○藥戒

客有病瘕者積於其中伏而不得下自外至者掣而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之掣者柔而不支焦膈導達呼吸開利快然若未始有疾者不數日瘕復作投以故藥其快然也亦如初自是不

逆月而然伍作而伍下每下輒愈然客之氣一語而三引体不勞而汗股不步而慄膚革無所耗於前而其中亦然莫知其所來嗟夫心痞非下不可已予從而下之術未爽也亦然独何如聞楚之南有良医焉往而問之醫璧曰子無怪是亦然者也凡子之術固為是亦然也坐吾語汝且天下之理有甚快於吾心者其未必有傷求無傷於終者則初無望其快於吾心夫陰伏而陽蓄氣與血不運而為痞構于子之胸中者其累大矣擊而去之不須更而除甚大之累和平之物不能為也必將擊搏震撓而後可夫人之和氣冲然而甚微泊乎其易危擊搏震撓之功未成而子之和益已病矣由是觀之則子之痞凡一快者子之和一傷矣不終月而快者五子之和乎之氣不既索乎故跡不勞而汗股不步而慄亦然如不可終日也且將去子之然而無害於和也子歸燕居三月而

後與之藥可為也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣少後矣

取藥而授之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而復常

且飲藥不得亟進客歸而行其說然其初使人慙莫因然而運之

蓋三損藥而三反之也然自不見其所攻之效久較則月異而時

不同蓋終歲而疾平客謂醫再拜而謝之坐而問其故醫曰是醫

國之說也豈特醫之於疾哉子獨不見秦之治民乎悍不軍及性

而不聽分墮而不勤事故而不畏法令之不所治之不變則秦之

民嘗瘡矣商君見其瘡也厲以刑法威而斬伐悍厲猛鴛不

貸毫髮楚限而力鋤之於是乎秦之政如建紀瓠流

通四達無敢或拒而秦之瘡嘗一快矣自孝公以至三世也凡幾

瘡而幾快矣頑者已圯解強者已柔而秦之民無歡心矣史

公傳孝公用商鞅變法孝公曰善卒定變法之令令民為計伍
市相守同連望坐不告奸者各賜告奸者與斬擊政同者其賞者

與降敵故猛政一快者歡心一而積快而不已而秦之四支擗然

徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而

百疾皆起秦欲運其手足者臂而漠然不我應故秦之亡者是好

為快者之過也昔者先王之民其初亦嘗瘁矣先王豈不知耄然

擊去之以為速也惟其有傷於終也故不敢求快於吾心優柔而

撫存之教以仁義導以禮樂陰解其亂而除去其滯勞視而適然

有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無

所忤逆是以日去其戾氣而不嬰其歡心於是政成教遂安樂又

而無後患矣是以三代之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則

予之藥終年而愈疾蓋無足怪也故曰天下之理有快於吾心者

其末也必有傷求無傷於其終則初無望其快吾心雖然豈独於

治天下哉客再拜而託其說

○心胃痛及腹中痛

草薢丸治因飢餓勞役致脾胃虛而心火乘之不能滋榮心肺
上焦元氣衰敗因過冬天腎與膀胱之寒水大旺子能令母實助
肺金大旺相輔而來尅心乘脾故胃脘當心而痛此大復其難故
經云大寒必大復理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於
外又以大寒大燥二氣併而來之其入苦惡風寒耳鳴及腰背相
引而鼻內苦息肉不通不聞香臭額寒腦痛目時眩寒水反乘脾
土痰唾沫飲食反出腹中常痛心胃痛脇下急縮有時而痛腰
不能伸大便多泄而不祕下氣不絕或腹中鳴胸中氣亂心煩不
安而成霍亂之意膈咽不通極則有聲鼻中氣短遇寒滋甚或居
暖處方過口吸風寒則復作四肢厥逆身軀沉重不能轉側頭不
可以顧小便澀而欠此脾虛之至極也

摘皮 八分

蠟蚕 八分

草薺 四錢 麩裏煨熟去皮

澤瀉 一分

青皮 六分

吳茱萸 八分 洗去苦焙

半夏 一錢

黃芪 八分

益智仁 八分

人參 八分

麩末

炒四分

生甘草 六分

薑黃 四分

桃仁

湯浸土去皮夫七

當歸身

六分

柴胡

四分 詳脇下痛多用

大麥蘖 一錢半

炙甘草

六分

右除桃仁另研外餘同為末入桃仁研勻湯浸蒸餅丸如

桐子大每服三十九丸熱白湯送下旋斟酌虛實多少用之

神保丸治心膈痛腹脇痛腎氣痛血積痛

木香

胡椒

各一分

乾蝎

七個

巴豆

去心膜油十個

右為細末入巴豆霜令勻湯浸蒸餅為丸麻子大硃砂為

衣每服三九薑湯下

青止痛散治心氣痛不可忍

良薑 五兩

茴香 炒

甘草 炙各一兩半

丁香 半兩

右為末每服二錢沸湯點服不拘時

失笑散定心氣痛不可忍小腸氣痛

蒲黃 炒香

五靈脂 酒研海去砂土各等分為末

右先用醋調二錢熬成膏入水一錢煎七分食前熱服

三薑丸治心脾寒溫養脾胃療冷食所傷

乾薑 炮

良薑

右二味等分為細末麵糊為丸桐子大每服二三十九食

後陳皮湯下妊婦不宜服

七氣湯治七氣為病內結積聚心腹絞痛時發時止

人參

官桂

炙甘草

各一兩

半夏

五兩

右咬咀每服三錢水一大錢薑三片煎七分稍熱服

益智散治冷氣奔衝心脇臍腹脹痛絞痛

川烏四兩

益智二兩

乾薑半兩

青皮一兩

右咬咀每服三錢水二錢入鹽一捻薑五片棗二箇同煎至八分去粗溫服食前

茱萸丸治脾胃虛冷嘔逆醋心脹悶不決大效

官桂二兩

萸撥

萸澄茄各一兩

厚朴薑製

胡

椒各一兩

黑附子

炮去皮臍半兩

乾薑炮一兩

吳茱萸

黃連三兩好酒少許洗焙

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九食前溫米飲送下

日三服

高良薑湯治心腹疔痛如刺兩脇支滿而悶不可忍

良薑

厚朴

當歸

官桂

右以咀以水一升煎取四合強人分作二服勞人作三服

一服痛定止后服對病增損

胃脘當心而痛治驗

兩浙江淮都漕運使崔君長男雲卿年二十有五体本豐肥奉養膏粱時有熱證友人勸食寒涼物及服寒涼藥於至元庚辰秋病瘧久不除醫以砒霜等藥治之新吸水送下禁食熱物瘧病不除反添吐利脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不仕其苦屢易醫藥未嘗有效至冬還家百般治療而不瘥延至四月間因勞役煩心過度前證大作請予治之具說其由診得脉弦細而微手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少發飽則心下痞悶嘔吐酸水發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不

安須人額相抵而坐少時易之予思內經曰中氣不足溲便為之
變腸為之苦鳴下氣不足則謂痿厥心惡又曰寒氣客於腸胃之
間則卒然而痛得灸則已灸者熱也非其辛大熱之劑則不能愈
遂製一方名之曰

扶陽助胃湯方

乾薑

炮一升半

揀參

草薢

薤仁

甘草炙

白芍藥

各一升

陳皮

白木

吳茱萸

各五分

黑附

手炮

去皮二升

益智仁

五分一方一分

右咬咀都作一服水三觔生薑三片棗子二箇煎至一觔
去粗溫服食前三服大勢皆去痛減过半至秋先灸中脘
三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脉
以還少丹服之則喜飲食添肌肉潤皮膚明年春灸三里

二七壯乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行春以芳香助脾復以育氣湯加白檀香來治之戒以懲忿窒欲慎言語節飲食一年而平復

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以為君草豆蔻仁益智仁辛甘大熱治客寒犯胃為佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮橘皮苦溫補脾養氣水挾木勢亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水若藥味酸以瀉木來克土吳茱萸苦熱能瀉氣上逆於胸中以為使也